

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основным путём передачи птичьего гриппа человеку является контакт с больной домашней птицей или предметами, загрязнёнными её помётом. Наиболее высок риск заражения во время убоя, ощипывания, обработки и подготовки птицы для кулинарного приготовления.

Птица подлежит обязательной регистрации в администрации муниципального образования и в учреждении государственной ветеринарной службы. При регистрации птицы их владельцы будут ознакомлены с правилами содержания птицы, и в этом случае она будет обязательно учтена при вакцинации.

Запрещается держать птицу в квартирах, местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на лоджиях и балконах.

При продаже и транспортировке домашней птицы за пределы города, района оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца в учреждении государственной ветеринарной службы.

Строения для содержания домашней птицы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте. Периодически (2-3 раза в неделю) необходимо обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, лопаты, бабды) 3% горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнёзда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. Помёт птицы необходимо складировать в одном месте для его биотермического обеззараживания.

Корм для домашней птицы необходимо хранить в плотно закрытых и водонепроницаемых ёмкостях. Перед скармливанием корма обезвреживать термической обработкой.

В период угрозы птичьего гриппа, для предотвращения заражения домашних птиц, в индивидуальных хозяйствах необходимо всех птиц перевести на закрытое содержание, а на подворье установить пугала и трещётки для отпугивания диких птиц. В это время не рекомендуется покупать живых птиц для разведения или увеличения поголовья.

У заболевших домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетённое состояние. Отмечаются синюшность, опухание и почернение гребня и серёжек, а так же затруднённое дыхание.

В случае обнаружения больной или мёртвой птицы в домашних подворьях граждан нужно немедленно известить об этом ветеринарную службу. Необходимо избегать контакта с заболевшей или мёртвой птицей. Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого рабочей одежде. После окончания работы халаты стирают, сапоги чистят и моются мылом. Предметы одноразового пользования уничтожают. Руки моют с мылом.

Нельзя покупать продукты птицеводства, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, в местах несанкционированной торговли.

Продукты птицеводства следует употреблять в пищу только после термической обработки: яйца нужно варить не менее 10 минут, а мясо не менее 30 минут при температуре 100 градусов С.

После контакта с больной птицей необходимо в течение 7 дней контролировать температуру тела. В случае повышения температуры, а также при появлении симптомов острого респираторного заболевания или инфекции глаз – немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Государственная ветеринарная служба Шенкурского района